n.° 3.

Nous Commissaires nomes pour examiner une observation envoyé par mr Lemoine chirurgien de la compagnie des indes, en avons extrait ce qui suit

un jeune noir, d'une constitution robuste avoit une inclination decidée pour la lutte, ce jeu ne luy fut pas toujours egallement heureux, il fut renversé avec violence et en ressentit une douleur dans la region ombilicalle; mr le moine fut mandé et trouva beaucoup de fievre au malade, a legard du côté il ny fit aucune attention parceque ces sortes de malades confondent les douleurs de ventre et déstomac avec celle de côté: le malade fut saigné deux fois, il prit de l'emetique en lavage ce qui produisit l'expultion de trois vers d'un pied de long, l'on fit usage ensuitte d'aposemes purgatifs et vermifuges quel falut abandoner au bout de quinse jours acause de la foiblesse du malade, pour reparer ce desordre l'on donna d'un elixir vulnéraire dont mr le moine ne donne pas la recette, cependant apres lusage

ARC 57 n° 3

de cet elixir il est survenu un flux mêlé d'un sang
noiratre qui a jetté le malade dans un abattement si
considerable, qu'il a fallu abandonner l'usage de l'elixir et
le mettre a celuy de l'ipecacuanha, tous les secours n'ayant
produits aucun bon effet, les nuits devenant de plus en
plus facheuses, le noir se determina a rompre le silence
et avoua qu'il avoit latté avec des gens plus fort que luy;
mr lemoine posa la main a l'endroit que luy fut indiqué,
il sentit une grande chaleur et une espece de resistance
dans toutte l'etendue du ventre, il conclut de la qu'il y avoit
epanchement, je croy que la fluctuation auroit esté un
signe plus determinant, apres avoir preparé un apareil
il fit une incision de vingt lignes de longueur a la partie
lateralle droitte de la region ombelicalle, dans l'endroit
ou la douleur se faisoit sentir, il entra le doigt dans
la playe pour voir si le peritoine estoit coupé egallement
et il sorti par cette incision une grande quantité de
sang lavé, la playe fut pansé avec une pelotte pour

pour entretenir la dilatation, des compresses et un bandage de corps,
l'apareil fut humecté de sang pendant quelques jours enfin
la supuration s'est etablie, les accidents se sont dissipés et
en vingt cinq jours le malade a esté entierement guery.
si il y a du singulier dans cette observation c'est d'avoir
entretenu la playe du ventre ouverte avec une pelotte
sans que les intestins se soient échapés et sans que la
même pelotte se soit opposé a la guerison, comme un pareil
exemple pourroit estre dangereux nous estimons que
l'academie ne peut faire aucun usage de cette observation

a paris le 15 aoust 1755

[illegible]

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE